



کد سند: PEBRO136/A


تاریخ تدوین: ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۱۲/۰۱

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

آموزش به بیمار

شکستگی جمجمه



کلینیک پرستاری آموزش سلامت همه روزه به جز تعطیلات
پاسخگوی سوالات شما در رابطه با (دیابت، فشارخون، دیالیز،
مراقبت های پس از جراحی) می باشد:
(داخلی ۲۰۲۷) ۰۵۱۳۸۰۴۲۰۰۰



Velayat Hospital

من را اسکن کنید
واحد آموزش به بیمار
بیمارستان ولایت

کارهایی که در شکستگی جمجمه نباید انجام داد

شستن زخم سری که عمیق است یا خونریزی شدید دارد.

خارج کردن هر نوع شیء که از زخم بیرون زده است.

تکان دادن فرد در مواردی که کاملاً ضروری نیست.

تکان دادن مصدومی که گیج و خیره به نظر می رسد.

خارج کردن کلاه ایمنی در صورتی که مشکوک به آسیب جدی سر هستید.

بلند کردن کودکی که زمین خورده و نشانه های آسیب به سر را دارد.



با آرزوی سلامتی و بهبودی شما

آدرس سایت بیمارستان ولایت:

<https://velayat.mums.ac.ir/>

منبع:

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus>



درمان شکستگی جمجمه

پس از ارزیابی دقیق از میزان و شدت جراحات وارد شده به سر و استخوان جمجمه، پزشک در خصوص روش درمانی مناسب تصمیم گیری می کند. برخی شکستگی های جمجمه به مرور زمان و بدون نیاز به جراحی ترمیم می شوند. با این حال برخی دیگر از جراحات و شکستگی ها نیازمند انجام عمل جراحی هستند.

مهم ترین اقدامات بعد از شکستگی جمجمه

بی حرکت نگه داشتن مصدوم

توقف هرگونه خونریزی

احتیاط در تکان دادن مصدوم در صورت

استفراغ

توجه به تغییرات تنفس و هوشیاری فرد



در این پمفلت سعی شده است آموزش های لازم در رابطه با شکستگی جمجمه به شما داده شود، امید که با رعایت این نکات سلامتی خود را حفظ کرده و بهبود بخشید.



شکستگی جمجمه زمانی اتفاق می افتد که شدت ضربه به سر آن قدر قوی باشد که استخوان را بشکند. هرگونه ضربه به سر، شامل برخورد شیء، افتادن و زمین خوردن، آسیب سر در تصادف یا هر نوع سانحه، می تواند منجر به شکستگی جمجمه شود. اگر علائم آسیب سر دارید، باید تحت مراقبت پزشکی قرار بگیرید.

علل بروز شکستگی جمجمه

هرگونه ضربه به سر، شامل برخورد شیء، افتادن و زمین خوردن، آسیب سر در تصادف یا هر نوع سانحه، می تواند منجر به شکستگی جمجمه شود.



علائم شکستگی جمجمه

درد شدید در ناحیه دچار ضربه
برآمدگی و کبودی محل آسیب دیده
خونریزی در ناحیه زخم
خون ریزی از ناحیه گوش ها، بینی یا چشم
خروج مایع شفاف از بینی یا گوش ها
کبودی پشت گوش ها یا زیر چشم
احساس خواب آلودگی، گیجی یا احساس بی
قراری
از دست دادن توانایی تکلم و یا به صورت منقطع
صحبت کردن
مشکلات در بلعیدن غذا یا آب دهان
از دست دادن تعادل
ایجاد مشکل در بینایی مانند تار دیدن یا دوبینی
تغییرات در مردمک چشم مانند عدم عکس العمل
مردمک به نور
تشنج و استفراغ
از دست دادن آگاهی و احساس گیجی
عدم توانایی در حرکت دادن گردن
احساس بی حسی
کاهش شدید ضربان قلب
تنگی نفس



شنیدن زنگ در گوش ها یا مشکل در شنوایی
ضعف در عضلات صورت
مشکل در کنترل ادرار یا مدفوع

روش های تشخیصی در شکستگی جمجمه

همانطور که گفته شد شکستگی در نتیجه ضربات شدید وارده به سر اتفاق می افتد. از آنجایی که علائم بالینی شکستگی در برخی موارد به طور کامل بروز نمی کنند، تشخیص قطعی شکستگی با مراجعه به اورژانس بیمارستان انجام می شود.

پزشک در مرحله اول جمجمه بیمار را به منظور شناسایی ظاهر علائم زخم، ورم یا کبودی به دقت بررسی می کند. علاوه بر این، معاینه مردمک چشم یکی از روش های رایج تشخیص ضربات وارده به سر است. به منظور ارزیابی در خصوص شدت جراحات وارده از مقیاس کمای گلاسکو (GCS) استفاده می شود. با این حال، انجام تست های نورولوژیک و عکس برداری به روش سی تی اسکن یا MRI از مطمئن ترین روش های تشخیص شکستگی جمجمه هستند.

