



کد سند: PEBRO178/A

تاریخ تدوین: ۱۴۰۴/۰۶/۲۰

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۷/۰۶/۲۰

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۵

آموزش به بیمار لنفازکتازی ریه

Lymphangiectasia



کلینیک پرستاری آموزش سلامت همه روزه به جز تعطیلات
پاسخگوی سوالات شما در رابطه با (دیابت، فشارخون، دیالیز،
مراقبت های پس از جراحی) می باشد:

(داخلی ۲۰۲۷) ۰۵۱۳۸۰۴۲۰۰۰



من را اسکن کنید
واحد آموزش به بیمار
بیمارستان ولایت

درمان لنفازکتازی

معمولاً به محض مشاهده علائم اولیه و تشخیص بیماری،
درمان آغاز می شود. داروهای ضدالتهابی و آنتی بیوتیک
اولین روش درمان هستند. درمان ضد میکروبی و ریدی هم
کارساز است. در موارد جدی تر نیاز به جراحی و برداشتن
زخم یا حذف گره لنفی آلوده، ضروری است.



با آرزوی سلامتی و بهبودی شما

آدرس سایت بیمارستان ولایت:

<https://velayat.mums.ac.ir/>

منبع:

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus>



دلایل لنفازکتازی

شایع ترین علت لنفانژیت در انسان،
Streptococcus pyogenes گروه A
(strep) یا همان سویه a استرپتوکوکوس پایوژنز است،
اگرچه می تواند توسط قارچ *Sporothrix schenckii*
هم ایجاد شود. عفونت باکتریایی حاد
(عفونت استرپتوکوک)، عفونت باکتریایی استافیلوکوک،
عفونت پوستی در صورت ورود باکتری به جریان خون،
دیابت، هر گونه بیماری یا نقص سیستم ایمنی، استفاده
طولانی مدت از استروئیدها، آبله مرغان، التهاب غدد لنفاوی
ناشی از بافت سرطانی و بیماری هایی مانند بیماری کرون
هم، برخی از علل لنفانژیت هستند.



در این پمفلت سعی شده است آموزش های لازم در رابطه با مشکل تنفسی شما، به شما داده شود، امید که با رعایت این نکات سلامتی خود را حفظ کرده و بهبود بخشید.




دستگاه تنفس قسمتی از بدن انسان است که اکسیژن مورد نیاز سلول ها را فراهم آورده و دی اکسید کربن تولید شده توسط سلول ها را از بدن خارج میکند و مهمترین بخش آن ریه ها هستند. ریه بخشی از دستگاه تنفس است که تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن در آن صورت می پذیرد و در برگیرنده نایزک ها، کیسه های هوایی می باشد. ریه از دو بخش ریه سمت راست و ریه سمت چپ تشکیل شده است.



لنفانژکتازی

التهاب کانال های لنفاوی است که در اثر عفونت در محل دیستال کانال اتفاق می افتد. سیستم لنفاوی شامل یک شبکه از عروق، غدد و اندام های لنفاوی در سراسر بدن است.



علائم لنفانژکتازی

از نشانه های لنفانژیت می توان به بروز خطوط قرمز رنگ زیر پوست (بیشتر در نواحی بازو، پشت پا و روی دست)، قرمزی پوست در ناحیه پشت، سینه، صورت، گوش، بازو، دست و پا، تورم غدد لنفاوی، افزایش دمای پوست ناحیه گردن، تب، لرز، درد، سردرد، استفراغ، کاهش اشتها و درد عضلات اشاره کرد.

