



کد سند: PEBRO116/B

تاریخ تدوین: ۱۴۰۲/۰۸/۰۱

تاریخ ابلاغ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۱۲/۰۱

آموزش به بیمار

فاشئیت نکروزان (عفونت بافت زیر پوست)



کلینیک پرستاری آموزش سلامت همه روزه به جز تعطیلات پاسخگوی سؤالات شما در رابطه با (دیابت، فشارخون، دیالیز، مراقبت های پس از جراحی) می باشد:

(داخلی ۲۰۲۷) ۰۵۱۳۸۰۴۲۰۰۰



VELAYAT HOSPITAL

من را اسکن کنید

واحد آموزش به بیمار

بیمارستان ولایت

سایر عوامل خطر عبارتند از:

- ۱- زخمهای پوستی (سوختگی، ضربه، عمل جراحی)
 - ۲- سیستم ایمنی ضعیف به دلیل بیماری یا درمان دارویی
 - ۳- بیماریهای مزمن مانند بیماری قلبی، ریوی یا کبدی، بیماریهای ناشی از مصرف الکل یا ابتلا به دیابت
 - ۴- تماس جدید نزدیک با فرد مبتال به فاشئیت نکروزان ایجاد شده توسط باکتریهای استرپتوکوک گروه A
 - ۵- آبله مرغان عفونت تازه آبله مرغان میتواند خطر ابتلا به فاشئیت نکروزان را به شدت افزایش بدهد.
- . بنابراین اگرچه آبله مرغان در بسیاری از موارد عامل ایجاد بیماری نیست، عفونتهای پوستی استرپتوکوک میتواند از عوارض آبله مرغان باشد



با آرزوی سلامتی و بهبودی شما

آدرس سایت بیمارستان ولایت:

<https://velayat.mums.ac.ir/>

منبع:

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus>



روش درمان این بیماری چیست؟

استفاده از آنتی بیوتیک بخش مهمی از درمان فاشئیت نکروزان میباشد. البته معمولاً در فاشئیت نکروزان آنتی بیوتیک به تنهایی کافی نیست. دلیلش آن است که فاشئیت نکروزان تأمین خون برای بافتهای بدن را متوقف میکند و آنتی بیوتیک برای عمل کردن باید توسط خون به محل آلوده منتقل شود. عمل جراحی همراه با مصرف آنتی بیوتیک درمان رایج آن به شمار میرود

احتمال ابتلای من به فاشئیت نکروزان چقدر است؟
احتمال ابتلا شما به فاشئیت نکروزان توسط باکتریهای استرپتوکوک گروه A بسیار اندک است. در بیسی، حدود ۴ نفر از هر ۱ میلیون نفر هر ساله به آن مبتال میشوند. احتمال ابتال حتی در کسانی که در تماس نزدیک و طولانی با فرد مبتال به فاشئیت نکروزان هستند بسیار کم است.

برخی افراد در معرض خطر بیشتری از ابتلا به این بیماری هستند. مصرف مواد مخدر تزریقی مهمترین عامل خطر میباشد.



در این پمفلت سعی شده است آموزش های لازم در رابطه با فاشئیت نکروزان به شما داده شود، امید که با رعایت این نکات سلامتی خود را حفظ کرده و بهبود بخشید.



فاشئیت نکروزان چیست؟

فاشئیت نکروزان معمولاً با «بیماری به نام رایج گوشتخوار» شناخته میشود. این بیماری نوعی عفونت باکتریایی بسیار شدید است که به سرعت از طریق بافت، یا نسوج (گوشت) اطراف ماهیچهها منتشر میشود. در برخی موارد ظرف مدت ۱۲ تا ۲۴ ساعت منجر به مرگ میشود. از هر ۴ بیمار مبتلا به فاشئیت نکروزان ۱ نفر میمیرد.

فاشئیت نکروزان ممکن است از عفونت ناشی از یک بریدگی یا زخم جزئی شروع شود. ممکن است پس از عفونت آبله مرغان رخ بدهد. گاهی اوقات هیچگونه زخم پوستی یا آسیب دیدگی آشکاری وجود ندارد.

نشانه های این بیماری چیست؟

در اکثر مواقع دردی ناگهانی همراه با تورم و قرمز شدن در محل زخم رخ میدهد. ممکن است تب هم وجود داشته باشد. معمولاً درد بسیار شدیدتر از چیزی است که از آن نوع زخم یا جراحت انتظار میرود. گاهی اوقات درد در محلی دورتر از زخم رخ میدهد. درد میتواند به سرعت در بقیه ی دست، پا یا سایر بخشهای بدن پخش شود. این نوع عفونت میتواند موجب قانقاریا (مرگ بافتها در بخشی از بدن) بشود.



چه چیزی باعث فاشئیت نکروزان میشود؟

باکتریهای مختلفی موجب فاشئیت نکروزان میشوند. یکی از آنها گروه استرپتوکوک A است. این باکتریها روی پوست یا داخل بینی و گلوی افراد سالم پیدا میشوند. افراد زیادی حامل این باکتریها هستند اما بیمار نمیشوند؛ البته این باکتریها میتوانند موجب گلودرد میکروبی، مخمלק، عفونتهای پوستی و تب روماتیسمی هم بشوند.

هنوز کاملاً مشخص نشده است که چرا گروه باکتریهای استرپتوکوک A در مواردی نادر موجب فاشئیت نکروزان میشود. البته این باکتریها توکسینهایی تولید میکنند که به طور مستقیم بافت بدن را تخریب میکند و نیز موجب میشود که سیستم ایمنی بدن هنگام مبارزه با باکتریها بافت خود را نیز از بین ببرد.


این باکتریها چگونه منتشر میشوند؟

کسانی که در معرض بیشترین خطر ابتال از طریق یک فرد مبتال هستند عبارتند از:

کسانی که با فرد مبتال در یک خانه زندگی میکنند

کسانی که با فرد مبتال در یک اتاق میخوابند

کسانی که با ترشحات دهان یا بینی فرد مبتال تماس مستقیم دارند.



چگونه میتوان از فاشئیت نکروزان پیشگیری کرد؟

هیچ واکسنی برای پیشگیری از عفونتهای باکتریهای استرپتوکوک گروه A وجود ندارد. برای تماسهای نزدیک در موارد ابتلا به فاشئیت نکروزان از طریق (مثالاً باکتریهای استرپتوکوک گروه A) افرادی که در یک خانه زندگی میکنند) آنتی بیوتیک تجویز میشود

از آنجا که این گونه حاد از عفونت استرپتوکوکی میتواند به سرعت گسترش یابد، بهترین روش مراجعه به پزشک به محض رؤیت نشانهها میباشد. به یاد داشته باشید که یک نشانه مهم این بیماری درد بسیار شدید در محل زخم است.

