




کد سند: PEBRO26/C
تاریخ تدوین: 1400/11/28
تاریخ ابلاغ آخرین بازنگری: 1403/12/01
تاریخ بازنگری بعدی: 1406/12/01

مراقبت از کاتتر همودیالیز آموزش به بیمار



کلینیک پرستاری آموزش سلامت همه روزه به جز تعطیلات پاسخگوی سوالات شما در رابطه با (دیابت، فشارخون، دیالیز، مراقبت های پس از جراحی) می باشد:

(داخلی 05138042000 (2027



VELAYAT HOSPITAL

من را اسکن کنید
واحد آموزش سلامت
بیمارستان ولایت

مراقبت از کاتتر:

- اگر بخیه کاتتر باز یا کنده شد، در صورتی که کاتتر شما از نوع موقت است، باید مجدداً بخیه شود ولی در صورتی که کاتتر نوع دائمی باشد معمولاً نیاز قطعی به بخیه مجدد نیست. به هر صورت باید با پزشک خود مشورت نمایید.



با آرزوی سلامتی و بهبودی شما
بیمارستان ولایت:

<https://velayat.mums.ac.ir/>

منبع:

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus>



مراقبت از کاتتر

- در صورتی که کاتتر از محل خود خارج گردید به هیچ عنوان دستکاری یا سعی در برگرداندن آن به محل اولیه نکنید فقط بلافاصله به پزشک معالج مراجعه نمایید.

- در صورت تب و لرز و قرمزی پوست اطراف کاتتر، سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

- کاتتر از نوع موقت جز با نظر پزشک نباید بیش از سه هفته استفاده شود و کاتتر موقت بیماران باید هر چه سریعتر خارج شود و یک دسترسی جدید ایجاد شود، لذا در صورت داشتن کاتتر موقت هر چه سریعتر به پزشک خود برای تعبیه یک راه دسترسی عروقی دائمی مراجعه نمایید.

- اگر دیالیز شما به هر علتی قطع شد ولی کاتتر را به صلاحدید پزشک خود نگه داشته اید، حتماً در یک مرکز درمانی چند بار در هفته لوله های کاتتر را هپارینه کنید تا از لخته شدن خون در کاتتر و انسداد لوله ها جلوگیری شود.



مراجعه کننده عزیز:

در این پمفلت سعی شده است آموزش های لازم در رابطه با مراقبت از کاتتر همودیالیز به شما داده شود، امید که با رعایت این نکات سلامتی خود را حفظ و بهبود بخشید.

کاتتر همودیالیز چیست



یکی از انواع دسترسی عروقی ، کاتتر ورید مرکزی جهت همودیالیز است که به صورت قرار دادن یک لوله پلاستیکی از طریق پوست در یکی از رگ های اصلی بدن است. به وسیله کاتتر می توان رفت و برگشت خون از بدن به دستگاه دیالیز را جهت تصفیه فراهم نمود.

عملکرد دیالیز در بدن

در نبود کلیه، ماشین دیالیز مواد زائد مثل نمک و آب اضافی و تولیدات سمی را از بدن دفع می کند.



مراقبت از کاتتر

• پانسمان کاتتر 3 بار در هفته پس از انجام دیالیز در همان مرکز تعویض گردد و در غیر آن نیاز به تعویض پانسمان نمی باشد .

• در صورت خیس یا خونی شدن پانسمان در فواصل دیالیز پانسمان باید به روش استریل عوض شود.

• سرپوشهای کاتتر همیشه باید بسته باشد و فقط توسط پزشک یا پرستار به منظور اتصال به دستگاه دیالیز باز شود.

• از وارد آمدن ضربه و یا ایجاد کشش به کاتتر پرهیزید.

• در صورت جابه جا شدن کاتتر، آن را به جلو یا عقب حرکت ندهید و با پانسمان محکم در محل ثابت نگهدارید و به پزشک مراجعه کنید.

• بست های کاتتر غیر از زمان دیالیز باز و بسته نشود (فقط توسط پزشک یا پرستار).



مراقبت از کاتتر

• از هرگونه خم شدن لوله های کاتتر جلوگیری کنید. در صورت خروج کاتتر از محل، فوراً یک پانسمان فشاری روی آن بگذارید و به پزشک معالج خود و یا اورژانس بیمارستان مراجعه نمایید از هرگونه دستکاری پرهیز نمایید.

• در صورت خونریزی از محل کاتتر پانسمان فشاری گذاشته و به پزشک معالج و یا اورژانس مراجعه کنید.

• استحمام بلامانع است، فقط قسمت خارجی کاتتر هرگز نباید در آب غوطه ور شود.

• شستشوی محل کاتتر با اسفنج حجیم خیس در هفته های اول و با ریختن آب بر روی آن در هفته های بعد بلامانع است.

• زمان استحمام باید تا حد امکان کوتاه باشد.

• برای استحمام بهتر است به صورت ترتیبی هر ناحیه را شستشو دهید تا آب کمتری به سمت کاتتر سرازیر شود.

• محل کاتتر کاملاً تمیز و خشک نگهداری شود.

