



کد سند: PEBRO29/B

تاریخ تدوین: ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۵/۰۵/۰۱

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۰

## آموزش به بیمار

### کوردی آلت (انحنای آلت)

کلینیک پرستاری آموزش سلامت همه روزه به جز تعطیلات  
پاسخگوی سوالات شما در رابطه با (دیابت، فشارخون، دیالیز،  
مراقبت های پس از جراحی) می باشد:  
(داخلی ۲۰۲۷) ۰۵۱۳۸۰۴۲۰۰۰



من را اسکن کنید  
واحد آموزش به بیمار  
بیمارستان ولایت

• عفونی شدن زخم (قرمزی التهاب و ترشح از

زخم)

- خونریزی از محل عمل
- پانسمان خیلی سفت باشد
- در صورتی که حجم ادرار کافی نباشد
- سختی در ادرار کردن



با آرزوی سلامتی و بهبودی شما

آدرس سایت بیمارستان ولایت:

<https://velayat.mums.ac.ir/>

منبع:

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus>



• در صورت خونریزی از محل عمل و تب بالای

۳۸,۵ درجه و عفونی شدن زخم و سخت ادرار

کردن به مطب مراجعه شود.

• کودک الزاما نباید در رختخواب باشد اما به آرامی

راه برود و بازی کند. کودک باید از سه چرخه و

دوچرخه به مدت دوهفته پرهیز نماید ولی کودک

به مدت یک ماه پس از عمل جراحی مجاز به

حمام در وان نیست.

در موارد زیر به پزشک خود مراجعه کنید:

• عدم کنترل درد با تجویز مسکن

• تداوم تهوع و استفراغ پس از عمل در ۲۴ ساعت

اول

• کودک قادر به آشامیدن و خوردن نباشد

• دمای بالای ۳۸ درجه



در این پمفلت سعی شده است آموزش های لازم در رابطه با شکستگی انگشتان و کف پا به شما داده شود، امید که با رعایت این نکات سلامتی خود را حفظ کرده و بهبود بخشید.



### خمیدگی آلت (کوردی آلت):

میتواند مادرزادی یا اکتسابی باشد انحنا به سمت بالا پایین چپ یا راست رخ میدهد. در کودکان بیشتر همراه با هیپوسپادیازیس ( بیماری که مجاری ادرار در مسیر خود تشکیل نمی شود.) دیده میشود. علت آن کوتاهی سمت دارای انحنا است.



### روش تشخیصی خمیدگی آلت :

۱. با معاینه توسط پزشک تشخیص داده میشود.
۲. با نشانه هایی که توسط والدین دیده میشود.
۳. گاهی نیاز به عکسبرداری از زوایای مختلف است.

### درمان:

در صورتی که زاویه تنه آلت بیش از ۳۰ درجه باشد به کمک جراحی اصلاح میشود. بهترین زمان اصلاح بین ۶ تا ۱۸ ماهگی است.

### علل مهم کوردی یا انحنای آلت:

مهمترین علت تکامل صحیح آلت در دوران جنینی میباشد که نقص در قسمتی از پوست یا بافت آلت باعث ایجاد این انحنا میباشد.



### عوارض جراحی:

- خونریزی
- کوتاه شدن آلت
- عفونت

### آموزش های بعد از عمل:

- تورم آلت بعد از عمل طبیعی است
- آنتی بیوتیک ها و مسکن ها طبق دستور مصرف شود
- از فشار روی ناحیه عمل جلوگیری شود
- شست و شوی زخم مرتب با سرم شست و شوی (نمکی) انجام شود.

