



کد سند: PEBRO162/A

تاریخ تدوین: ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۰

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۱۲/۰۱

آموزش به بیمار پاپیلومای مرواریدی آلت تناسلی



کلینیک پرستاری آموزش سلامت همه روزه به جز تعطیلات
پاسخگوی سوالات شما در رابطه با (دیابت، فشارخون، دیالیز،
مراقبت های پس از جراحی) می باشد:
(داخلی ۲۰۲۷) ۰۵۱۳۸۰۴۲۰۰۰



من را اسکن کنید.
واحد آموزش به بیمار
بیمارستان ولایت

پیشگیری

ختنه در بدو تولد ممکن است بروز پاپول های آلت تناسلی مرواریدی را کاهش دهد، زیرا فراوانی ضایعات در مردان ختنه شده (۱۲٪) در مقایسه با مردان ختنه نشده (۲۲٪) کمتر است.



با آرزوی سلامتی و بهبودی شما

آدرس سایت بیمارستان ولایت:

<https://velayat.mums.ac.ir/>

منبع:

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus>



درمان

پاپول های آلت تناسلی مرواریدی معمولاً بدون علامت هستند و نیازی به درمان ندارند. اطمینان دادن به بیمار اولین خط مراقبت است هنگامی که ماهیت خوش خیم ضایعات توضیح داده شد، اکثر بیماران می پذیرند که درمان لازم نیست. کسانی که اصرار به درمان دارند ممکن است انتخاب کنند که تحت درمان انتخابی با برش جراحی معمولی یا لایه برداری مجدد با لیزر دی اکسید کربن قرار گیرند. کاربرد موضعی پودوفیلین تا حد زیادی برای درمان پاپول های آلت تناسلی مرواریدی بی اثر بوده است..



در این پمفلت سعی شده است آموزش های لازم در رابطه با پاپیلوما مرواریدی آلت تناسلی به شما داده شود، امید که با رعایت این نکات سلامتی خود را حفظ کرده و بهبود بخشید.



پاپیلوما مرواریدی آلت تناسلی

پاپول های آلت تناسلی مرواریدی، پاپول های گنبدی شکل کوچک تا رشته ای به رنگ پوست هستند که معمولاً روی شیار یا تاج آلت تناسلی قرار دارند و معمولاً به صورت محیطی در یک یا چند ردیف قرار گرفته اند.

پاپول های آلت تناسلی مرواریدی یک نوع طبیعی در نظر گرفته می شوند و پتانسیل بدخیم ندارند. آنها از طریق فعالیت جنسی منتقل نمی شوند.

پاپول های آلت تناسلی مرواریدی در مردان ختنه نشده بیشتر از مردان ختنه شده مشاهده می شود. با این حال، مکانیسم های زیربنایی توسعه آنها ناشناخته باقی مانده است. قابل توجه است که در مردان ختنه نشده با پاپول آلت تناسلی مرواریدی که در اواخر عمر تحت ختنه قرار می گیرند، معمولاً پسرفت پاپول ها مشاهده می شود.



عوامل مستعد کننده:

افزایش فراوانی را در مردان سیاه پوست در مقایسه با مردان سفیدپوست نشان داد. پاپول های آلت تناسلی مرواریدی بیشتر در مردان در دهه دوم یا سوم زندگی مشاهده می شود و با افزایش سن به تدریج فراوانی آن کاهش می یابد. پاپول های آلت تناسلی مرواریدی فقط در مردان دیده می شود.

پیش آگهی

پاپول های آلت تناسلی مرواریدی معمولاً بدون علامت هستند و در طول زندگی باقی می مانند، اگرچه ضایعات ممکن است به تدریج با افزایش سن کمتر قابل توجه شوند.



تاریخچه

اکثر بیماران مبتلا به پاپول آلت تناسلی مرواریدی به دنبال مشاوره پوست هستند زیرا نگران احتمال ابتلا به یک بیماری مقاربتی هستند. پاپول های آلت تناسلی مرواریدی معمولاً زگیل تناسلی یا در موارد کمتر با زگیل آبکی اشتباه گرفته می شوند.

معاینه فیزیکی

در معاینه فیزیکی، پاپول های آلت تناسلی مرواریدی به صورت یک یا چند ردیف از پاپول های کوچک، گوشتی، صاف و گنبدی تا رشته ای شکل ظاهر می شوند که به صورت محیطی در اطراف تاج یا شیار آلت تناسلی آلت تناسلی به منظور تجسم تاج و شیار در یک مرد ختنه نشده، اغلب لازم است که پوست ختنه گاه به صورت دستی جمع شود. به طور کلی، پاپول های آلت تناسلی مرواریدی در مردان ختنه شده در همان نقاط آناتومیک به راحتی قابل مشاهده است.

