



کد سند: PEPa105/B

تاریخ تدوین: ۱۴۰۲/۰۸/۰۱

تاریخ ابلاغ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۱۲/۰۱

آموزش به بیمار خروج پلاتین



کلینیک پرستاری آموزش سلامت همه روزه به جز تعطیلات پاسخگوی سوالات شما در رابطه با (دیابت، فشارخون، دیالیز، مراقبت های پس از جراحی) می باشد:
(داخلی ۲۷۲۰۰۰) ۰۵۱۳۸۰۴۲۰۰۰



من را اسکن کنید
واحد آموزش به بیمار
بیمارستان ولایت

*** پلاتین خارج شده دور انداخته می شود و مجدداً قابل استفاده نیست ***



با آرزوی سلامتی و بهبودی شما

آدرس سایت بیمارستان ولایت:

<https://velayat.mums.ac.ir/>

منبع:

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus>



اگر ایمپلنت بکار رفته قطعات شکسته شده را محکم نگرفته باشد حتی با وجود جوش نخوردن شکستگی باید خارج شود. در این موارد پزشک جراح پس از خارج کردن ایمپلنت، برای بی حرکت کردن استخوان های شکسته شده، معمولاً از وسیله خارجی دیگری استفاده می کند.

نکات خودمراقبتی پس از خارج کردن پلاتین:

- ۱ - پانسمان را به روش استریل تعویض کنید. به این منظور می توانید به درمانگاه بیمارستان یا نزدیک ترین درمانگاه به منزل خود مراجعه کنید.
- ۲ - در صورت وجود درد زیاد، تب، تورم اندام، ترشح چرکی و قرمزی به پزشک مراجعه کنید.
- ۳ - داروهای تجویز شده را به طور منظم و در ساعت مشخص مصرف کنید.
- ۴ - در صورت استحمام، روی محل عمل را با پلاستیک بپوشانید تا خیس نشود.
- ۵ - طبق دستور پزشک خود جهت ویزیت و کشیدن بخیه ها مراجعه کنید.
- ۶ - در صورت تجویز فیزیوتراپی جهت بازگشت حرکت عضو شکسته، به فیزیوتراپ مراجعه کنید.
- ۷ - تا هنگامی که پزشک اجازه نداده است، بر روی عضوی که تحت عمل جراحی قرار گرفته است، وزن گذاشته نشود.



مراجعه کننده عزیز

در این پمفلت سعی شده است آموزش های لازم در رابطه با خروج پلاتین به شما داده شود، امید که با رعایت این نکات سلامتی خود را حفظ کرده و بهبود بخشید.



پلاتین چیست؟

برای ثابت کردن شکستگی ها از وسایلی استفاده می گردد که یکی از این وسایل پلاتین می باشد، پلاتین زمانی که استخوان کاملاً جوش بخورد روی آن قرار می گیرد بعد می توان آن را با صلاحدید پزشک خارج کرد. پلاتین چند تا پیچ دارد که وقتی شکستگی را جا می اندازیم آنها را روی استخوان شکسته قرار می دهیم و بعد ثابت می شود. پلاتین باید تا زمانی که استخوان کاملاً جوش بخورد روی آن بماند. سه تا ۶ ماه طول می کشد تا اغلب شکستگیها جوش بخورد.

خارج کردن پلاک:


امروزه بسیاری از شکستگی ها با عمل جراحی درمان می شوند و در اغلب این شکستگی ها برای بی حرکت کردن استخوانهای شکسته شده، از وسایل فلزی استفاده می شود که به آنها ایمپلنت می گویند. انواع مختلفی از ایمپلنت ها مورد استفاده قرار می گیرد.



به ابزارهای فلزی که جراح ارتوپد در درون بدن کار می گذارد ایمپلنت می گویند. اینکه پزشک معالج از کدامیک از این وسایل برای بی حرکت کردن شکستگی استفاده کند، بسته به محل و نوع شکستگی متفاوت است.

انواع ایمپلنت :

- وایر یا سیم
- پلاک
- راد یا میله
- پین
- نیل یا میخ
- پیچ و فیکساتور خارجی



چه هنگام نیاز به خارج

کردن پین و پلاتین ها از

استخوان می باشد؟

گاهی اوقات بخصوص در شکستگی های دست ، بعد از جراحی سر پین در خارج از پوست باقی می ماند. در این موارد پس از گذشت چند هفته که استخوانهای شکسته شده به اندازه کافی به یکدیگر می چسبند، پین ها توسط پزشک ارتوپد خارج می شوند.



در چه موارد دیگری پلاتین بعد از جراحی

شکستگی باید خارج شود؟

فشار موضعی پیچ و پلاک: اگر قسمتی از ایمپلنت از استخوان بیرون زده و برجسته باشد و این بیرون زدگی زیر پوست لمس شده و فرد را اذیت کند و روی مفصل کناری ، عروق و اعصاب یا تاندون ها و عضلات اطرافش فشار بیاورد و مانع کارکرد مناسب آنها شود، این ایمپلنت باید به وسیله عمل جراحی از بدن خارج شود.

جابه جا شدن پلاتین : اگر ایمپلنت از جای خود جابجا شود و بعد از جابجایی مشکلات حالت قبل را بوجود بیاورد، باید خارج شود.

عفونت استخوان:

گاهی اوقات محل جراحی عفونت می کند. در این موارد میکروب ها به سطح فلزی ایمپلنت چسبیده و دیواره ای در اطراف خود ترشح می کنند که مانع از نفوذ آنتی بیوتیک ها می شود. این پدیده موجب می شود درمان عفونت مشکل شود. در این موارد اگر ایمپلنت در جای خود محکم باشد و قطعات شکسته شده را به خوبی در جای خودشان نگه داشته باشد و شکستگی جوش نخورده باشد، پزشک جراح ایمپلنت را خارج می کند.

